

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Метровенс Гино.

Международное непатентованное название: метронидазол + неомицина сульфат + нистатин.

Лекарственная форма: суппозитории вагинальные.

Состав: каждый вагинальный суппозиторий содержит:

Метронидазол ВР 500 мг;

Неомицина сульфат ВР 65 000 МЕ;

Нистатин ВР 100 000 МЕ;

Вспомогательные вещества: полиэтиленгликоль 1500, полиэтиленгликоль 6000, метилпарабен, пропилпарабен, бутилгидрокситулол.

Фармакотерапевтическая группа: препарат с антибактериальным, противогрибковым и противовоспалительным действием для местного применения в гинекологии.

Код ATX: G01AX.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика:

Комбинированный препарат для местного применения в гинекологии. Действие препарата обусловлено свойствами входящих в его состав компонентов.

Метронидазол – производное 5-нитроимидазола, оказывает противомикробное действие, эффективен относительно простейших. При взаимодействии с протеинами микроорганизмов 5-нитрогруппа Метронидазол восстанавливается и препятствует синтезу нуклеиновых кислот. Угнетение синтеза нуклеиновых кислот приводит к разрушению ДНК микроорганизмов и их гибели. Метронидазол эффективен относительно широкого спектра микроорганизмов и простейших, которые являются причиной вагинальных инфекций, в том числе *Gardnerella vaginalis*, *Streptococcus* spp. и *Trichomonas vaginalis*.

Неомицина сульфат – антибиотик широкого спектра действия из группы аминогликозидов. Действует бактерицидно.

Активен в отношении грамположительных (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus pneumoniae*) и грамотрицательных (*Escherichia coli*, *Shigella dysenteriae*, *Shigella flexneri*, *Shigella boydii*, *Shigella sonnei*, *Proteus* spp.) микроорганизмов.

Нистатин – активен в отношении дрожжеподобных грибов рода *Candida*, изменяет проницаемость клеточных мембран и замедляет их рост.

Фармакокинетика:

Исследования фармакокинетики препарата Метровенс Гино не проводились в связи с низкой системной абсорбцией.

Показания к применению:

Лечение вагинитов, вызванных чувствительными к препаратору микроорганизмами и неспецифических вагинитов:

Официальные рекомендации относительно правильного использования антибактериальных средств должны быть прияты во внимание.

Лечение вагинитов относится к трем этиологиям следующим образом:

- бактериальный вагиноз или неспецифический вагинит;
- вульвовагинальный кандидоз;
- бактериальный или смешанный вагинит.

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Беременность и лактация:

Применение препарата Метровенс Гино при беременности и в период грудного вскармливания возможно только в случае, когда потенциальная польза для матери превышает риск для плода или младенца.

Способ применения и дозы:

Дозировка

Взрослые:

Вагинит с чувствительными микробами и неспецифический вагинит:

Назначают по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки в течение 10 дней (в сочетании с приемом таблетированной формы).

После введения необходимо находиться в горизонтальном положении в течение 10-15 мин.

Необходимо провести одновременное лечение полового партнера независимо от того, требует он лечения или нет.

Лечение метронидазолом не должно продолжаться более 10 дней и повторяться чаще, чем 2-3 раза в год.

Практические советы:

Необходимо соблюдать гигиенические рекомендации (ношение хлопкового белья, избегание спринцевания, ношение внутреннего тампона во время лечения и, насколько это возможно, устранение способствующих факторов).

Не следует прекращать лечение во время менструации.

Способ введения:

Препарат предназначен только для интравагинального применения.

Побочные действия:

Местные реакции: редко - чувство жжения, местное раздражение (особенно в начале терапии).

Прочее: крайне редко - аллергические реакции.

Передозировка:

В связи с низкой степенью абсорбции в системный кровоток передозировка маловероятна.

Лекарственные взаимодействия:

Клинически значимого лекарственного взаимодействия препарата с другими лекарственными средствами не выявлено.

Особые указания:

При вагинитах и трихомониазе необходимо провести одновременное лечение полового партнера из-за опасности повторного заражения.

Форма выпуска:

5 суппозиториев в каждом блистере ПВХ. 2 блистера вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок хранения:

2 года.

Условия отпуска:

По рецепту врача.